


# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



## ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного средства **ХОНДРОМЕД**

### Торговое название

Хондромед

### Международное непатентованное название

Хондроитина сульфат (chondroitin sulfate).

### Описание

Капсулы твердые желатиновые желтого цвета. Содержимое капсул – порошок от белого с желтоватым оттенком до светло-желтого с сероватым оттенком цвета, без запаха.

### Состав

*Активное вещество:* хондроитина сульфата натриевая соль - 250 мг.

*Вспомогательные вещества:* кальция стеарат, крахмал картофельный.

*Состав оболочки капсулы:* хинолиновый желтый (Е 104), пунцовый 4R (Е 124), азорубин (Е 122), титана диоксид (Е 171), желатин.

### Форма выпуска

Капсулы.

### Фармакотерапевтическая группа

Прочие нестероидные противовоспалительные препараты и противоревматические средства.

### Код ATX

M01AX25

### Фармакологическое действие

#### Фармакодинамика

Основные действующие вещества лекарственного средства – натриевые соли хондроитина сульфата А и С (средняя молекулярная масса 11 000 дальтон). Хондроитина сульфат – высокомолекулярный мукополисахарид. Является основным компонентом протеогликанов, составляющих вместе с коллагеновыми волокнами хрящевой матрикс.

Лекарственное средство оказывает противовоспалительное, анальгезирующее действие. Хондроитина сульфат подавляет активность энзимов, вызывающих деградацию суставного хряща: ингибитирует металлопротеиназы, в частности, лейкоцитарную эластазу. Снижает активность гиалуронидазы. Хондроитина сульфат частично блокирует выброс свободных кислородных радикалов, способствует блокированию хемотаксиса. Стимулирует выработку хондроцитами протеогликанов. Противовоспалительный и анальгезирующий эффекты достигаются благодаря снижению выброса в синовиальную жидкость медиаторов воспаления и боли, а также вследствие подавления секреции лейкотриена В4 и простагландинов Е2.

Применение лекарственного средства препятствует сжатию хрящевой ткани, выполняет роль смазки суставных поверхностей, нормализует продукцию синовиальной жидкости, способствует уменьшению интенсивности боли.

**Фармакокинетика**  
Не исследована.

### **Показания к применению**

Облегчение симптомов (от легкой до умеренной боли) при подтвержденном диагнозе остеоартрита коленного и тазобедренного суставов.

### **Способ применения и дозировка**

#### Взрослые и подростки старше 15 лет:

По две капсулы два раза в день (1000 мг в сутки).

Капсулы принимают внутрь, проглатывая целиком и запивая достаточным количеством воды.

#### Применение у детей:

Данные по эффективности и безопасности применения хондроитина сульфата у детей младше 15 лет отсутствуют, поэтому его применение у детей не рекомендуется.

### **Побочное действие**

*Со стороны кожи и подкожной клетчатки:* частота неизвестна – эритема, крапивница, экзема, макулопапулезная сыпь, сопровождающаяся или не сопровождающаяся зудом и/или отеком.

*Со стороны желудочно-кишечного тракта:* редко – тошнота, рвота.

*Со стороны иммунной системы:* очень редко – ангионевротический отек.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к хондроитина сульфату или любым другим компонентам лекарственного средства, беременность, период грудного вскармливания, дети младше 15 лет.

### **Меры предосторожности**

Не рекомендуется применение лекарственного средства во время беременности и в период грудного вскармливания.

### **Применение при беременности и кормлении грудью**

Не рекомендуется применять лекарственное средство при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием данных, подтверждающих безопасность его приема у женщин в этот период.

### **Влияние на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами**

Лекарственное средство не оказывает влияния на способность к управлению автотранспортом и другими механизмами.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не описано взаимодействий хондроитина сульфата с другими лекарственными средствами.

### **Передозировка**

В случае передозировки назначают симптоматическое лечение.

### **Условия хранения**

В защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.


### **Срок годности**

2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Упаковка**

По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке. По три или шесть контурных ячейковых упаковок по 10 капсул вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачке из картона.

**Условия отпуска**  
Без рецепта.



**Информация о производителе**

СООО «Лекфарм», Республика Беларусь, 223141, г. Логойск, ул. Минская, д. 2а/4  
Тел./факс: (01774)-53801, [www.lekpharm.by](http://www.lekpharm.by).