

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Стрептоцид

наименование лекарственного препарата

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать применение этого препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.
Сохраняйте инструкцию по применению, она может понадобиться вновь.
Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.
Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

Регистрационный номер: ЛП-002847

Торговое наименование: Стрептоцид.

Международное непатентованное или группировочное наименование: Сульфаниламид.

Лекарственная форма: Порошок для наружного применения.

Состав:

Действующее вещество:

Сульфаниламид (стрептоцид) – 2 г, 5 г, 10 г

Описание: Белый или желтовато-белый кристаллический порошок.

Фармакотерапевтическая группа:

Противомикробное средство – сульфаниламид.

Код АТХ: D08BA05

Фармакологические свойства.

Стрептоцид – противомикробное бактериостатическое средство. Механизм действия обусловлен конкурентным антагонизмом с парааминобензойной кислотой (ПАБК) и угнетением дигидроптеросинтетазы, что приводит к нарушению синтеза дигидрофолевой, а затем тетрагидрофолевой кислоты и в результате – к нарушению синтеза нуклеиновых кислот микроорганизмов. Активность проявляется в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: *Escherichia coli*, *Shigella* spp., *Vibrio cholerae*, *Clostridium perfringens*, *Bacillus anthracis*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Yersinia pestis*, *Shigella* spp., *Acinetobacter israelii*, *Toxoplasma gondii*.

Показания к применению.

В составе комплексной терапии: гнойные раны, инфицированные ожоги (II ст.) и другие гнойно-воспалительные процессы кожи.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к сульфаниламидам, заболевания кровотоковой системы, угнетение костного мозга, анемия, хроническая сердечная недостаточность, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, беременность, период грудного вскармливания.

С осторожностью: Детский возраст до 3-х лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы.

Наружно, наносят непосредственно на пораженную поверхность (в виде порошка для наружного применения), перевязки проводят через 1-2 дня. Максимальные дозы для взрослых: разовая доза – 5 г, максимальная суточная доза – 15 г.

Детям старше 3 лет – 300 мг – разовая доза, суточная доза 300 мг.

Если после лечения улучшения не наступило, то следует обратиться к врачу.

Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Побочное действие.

При повышенной чувствительности к сульфаниламидным средствам возможны аллергические реакции, развитие которых требует немедленной отмены препарата.

Кроме того, возможны головная боль, головокружение, тошнота, рвота, диспепсия, цианоз, лейкопения, агранулоцитоз, кристаллурия.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

Симптомы: тошнота, рвота, кишечная колика, головокружение, головная боль, сонливость, депрессия, обморочные состояния, спутанность сознания, нарушение зрения, лихорадка, гематурия, кристаллурия; при продолжительной передозировке – тромбоцитопения, лейкопения, металобластная анемия, желтуха.

Лечение: обильное питье; при случайном приеме внутрь – промывание желудка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Микелотоксические лекарственные средства усиливают проявление гематотоксичности препарата.

Если Вы принимаете другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Стрелтоцид проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания.

Во время терапии рекомендуется обильное щелочное питье. При необходимости одновременно назначают противомикробные препараты внутрь. При появлении реакций повышенной чувствительности лечение следует прекратить. При длительном лечении рекомендуется систематический контроль картины крови, функции почек и печени.

Влияние препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Исследования влияния препарата на скорость реакции при управлении транспортными средствами, работе с механизмами не проводились.

Учитывая побочные действия лекарственного средства (головокружение) следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами, механизмами.

Форма выпуска.

Порошок для наружного применения.

По 2 г, 5 г или 10 г в термосвариваемые пакеты из материала упаковочного комбинированного, материала комбинированного «буфлен» или ламинированная бумага.

По 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20, 50, 100 или 300 пакетов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

По 50, 100, 200, 400 пакетов без пачки вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку картонную (для стационаров).

По 2 г, 5 г или 10 г во флаконы или флаконы-капельницы стеклянные, укупоренные пробками или пробками-капельницами из полистилена высокого или низкого давления и навинчиваемыми крышками из полистилена высокого или низкого давления.

По 5 г или 10 г во флаконы, флаконы-капельницы из полистилена высокого или низкого давления со средствами укупорочными или во флаконы из полиэтилентерефталата со средствами укупорочными.

По 5 г или 10 г в банки полимерные с дозаторами и крышками.

Каждый флакон, флакон-капельницу или банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается упаковка флаконов, флаконов-капельниц, банок без пачки от 30 до 150 штук вместе с равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку (для стационаров).

Условия хранения.

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 30 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности.

5 лет. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ОАО «Ивановская фармацевтическая фабрика», Россия

153007, г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 19-а

Тел.: (4932) 33-42-73, факс: (4932) 33-42-72