

НД РБ

2044 Б-2020



Инструкция по медицинскому применению листок-вкладыш

Шалфей

12,5 мг, таблетки для рассасывания

Действующее вещество: шалфея листьев экстракт сухой

Перед применением данного препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 7 дней вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Шалфей и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед применением препарата Шалфей.
3. Применение препарата Шалфей.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Шалфей.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ШАЛФЕЙ И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Лекарственный препарат Шалфей содержит шалфея листьев экстракт сухой.

Фармакотерапевтическая группа: Прочие средства для местного лечения заболеваний полости рта.

Комбинированный препарат, содержащий комплекс биологически активных веществ. Оказывает противовоспалительное, противомикробное действие, обладает вяжущими свойствами.

Показания к применению:

В комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта и глотки (стоматит, гингивит, тонзиллит, фарингит).

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение, через 7 дней необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ШАЛФЕЙ

Не применяйте препарат Шалфей, если у вас аллергия на шалфей или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша.

Особые указания и меры предосторожности:

Перед применением препарата Шалфей проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не следует превышать рекомендуемые дозы препарата. Не рекомендуется применять лекарственный препарат более 7 дней.

Препарат содержит сорбитол. Лекарственный препарат не рекомендуется применять пациентам с врожденной непереносимостью фруктозы. Может оказывать легкое слабительное действие. Если во время применения лекарственного препарата симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить прием лекарственного препарата и обратиться к врачу.

Дети и подростки:

Препарат Шалфей противопоказан детям и подросткам до 18 лет.

2044 Б-2020

Другие препараты и препарат Шалфей:

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете принимать другие лекарственные препараты.

Прием препаратов шалфея может повлиять на эффекты лекарственных препаратов, действующих через ГАМК-рецепторы (например, барбитураты, бензодиазепины). Одновременное применение с данными лекарственными препаратами не рекомендовано. Препараты шалфея могут взаимодействовать с гипогликемическими (препараты для снижения уровня сахара в крови) и противосудорожными средствами, усиливать седативное действие других лекарственных препаратов и алкоголя. Лекарственный препарат может влиять на всасывание железа и других минералов.

Беременность и грудное вскармливание:

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Безопасность применения при беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием данных применять во время беременности и в период кормления грудью противопоказано. Туйон, входящий в состав листьев шалфея, может оказаться неблагоприятное влияние на течение беременности.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами:

Применение лекарственного препарата может повлиять на способность управлять автомобилем и работать с механизмами. Во время лечения пациентам не рекомендовано управлять автомобилем или работать с техникой.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ШАЛФЕЙ

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

Взрослые: по 1 таблетке с интервалом в 2 часа. Максимально 6 таблеток в день.

Применение у детей и подростков:

Препарат противопоказан детям и подросткам до 18 лет.

Применение у пожилых пациентов:

Коррекция дозы не требуется. Не следует превышать рекомендуемые дозы.

Применение у пациентов с нарушением функции печени или почек:

Нет специфических рекомендаций для данной группы пациентов. Коррекция дозы не требуется. Не следует превышать рекомендуемые дозы.

Путь и способ введения:

Для местного применения. Держать во рту до полного рассасывания, не разжевывая.

Продолжительность терапии:

Продолжительность курса терапии не более 7 дней.


Если вы применили препарата Шалфей больше, чем следовало:

Применяйте Шалфей в соответствии с рекомендациями лечащего врача или в дозах, указанных в листке-вкладыше к препаратуре.

Возможные симптомы передозировки

Передозировка при приеме внутрь более 15 г листьев шалфея (около 26 таблеток настоящего лекарственного препарата) может проявляться ощущением жара, развитием тахикардии (учащенное сердцебиение), головокружения и эпилептических судорог.

Лечение симптоматическое.



2044 Б-2020

Если вы забыли принять Шалфей

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Шалфей может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможны аллергические реакции.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных.

Контактные данные для сообщений о нежелательных реакциях: «РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» <http://www.rceth.by>; адрес электронной почты: rcpl@rceth.by.

Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ШАЛФЕЙ

Храните препарат в недоступном и незаметном для детей месте.

Срок годности: 3 года.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить в защищенном от света и влаги месте при температуре не выше 25 °C.

Проконсультируйтесь с работником аптеки о том, как утилизировать ненужный лекарственный препарат. Эти меры способствуют защите окружающей среды.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ**Препарат Шалфей содержит**

Действующим веществом препарата является шалфея листьев экстракт сухой - 12,5 мг (содержит не менее 2,5 % розмариновой кислоты. Экстрагент: этанол (75 %): вода (1:10), об/об; соотношение исходного лекарственного растительного сырья к полученному экстракту - 10:1).

Вспомогательные вещества: шалфея испанского масло, лимонная кислота безводная, сахарин натрий, ароматическая добавка «Мед» (мальтодекстрин, натрия крахмал октенилсукцинат (E1450), пропиленгликоль (E1520), ароматическая композиция), магния стеарат, сорбитол.

Внешний вид препарата Шалфей и содержимое упаковки

Таблетки цилиндрические, двояковыпуклые, от светло-серого до светло-коричневого цвета, с вкраплениями от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, со специфическим запахом. По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки (ПВХ) и фольги алюминиевой.

По 1, 2 или 3 контурных ячейковых упаковок в картонной пачке с инструкцией по применению.

Не все размеры упаковок могут быть доступны для реализации.

Отпуск из аптек

Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель:ООО «Рубикон», Республика Беларусь,
210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б,
тел/факс: +375 (212) 36-37-06, тел.: +375 (212) 36-47-77,
e-mail: secretar@rubikon.by**Данный листок-вкладыш пересмотрен:**

12/2022

