

**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
(информация для пациента)

СОГЛАСОВАНО

Министерством здравоохранения

Республики Беларусь

Республиканская аптека-консультантская

г. Минск № 60

№ 01.14

Грудной сбор № 2,

сбор 50 г в пачке

Pectorales species № 2

Общая характеристика:

смесь неоднородных частиц серовато-зеленого цвета со светло-желтыми и серовато-коричневыми вкраплениями, проходящих сквозь сито (5600). Запах отсутствует.

**Состав:** мать-и-мачехи листья

- 20 г

подорожника большого листья

- 15 г

солодки корни

- 15 г

**Форма выпуска.** Сбор.

**Фармакотерапевтическая группа.** Отхаркивающие средства в комбинации.

**Фармакологические свойства.**

Оказывает

отхаркивающее

противовоспалительное действие.

и

**Показания к применению.** В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей (трахеит, бронхит). Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Способ применения и дозы.** 4 г (1 столовая ложка) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде (водяной бане) 30 мин. Охлаждают при комнатной температуре 10 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Взрослые принимают внутрь в теплом виде после еды по 1/3 стакана 3-4 раза в день.

Длительность лечения определяется врачом с учетом характера заболевания, достигнутого эффекта и переносимости препарата. В связи с содержанием листьев мать-и-мачехи не рекомендован прием лекарственного средства более 4 недель в течение года.

Курс лечения определяется врачом индивидуально для пациентов пожилого возраста и людей с нарушениями функций печени и почек.

При однократном пропуске дозы отвара продолжить со следующего по очереди приема.

Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать.

**Применение во время беременности и кормления грудью.** Противопоказан.

**Применение у детей.** Противопоказано детям до 18 лет.

**Побочное действие.** Возможны аллергические реакции при повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам лекарственного средства. Возможны реакции, описанные в разделе «Передозировка». В случае появления побочных эффектов или реакций, не упомянутых в инструкции, прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как, ромашка, арника, амброзия, тысячелистник, пижма, полынь, астра, хризантема. Артериальная гипертензия, холестаз, хронический гепатит, цирроз печени, заболевания печени и/или почек, хроническая почечная недостаточность, сахарный диабет, гипокалиемия, аритмия, заболевания сердца (миокардит, перикардит, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда), беременность, период кормления грудью, детский возраст до 18 лет.

**Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами.** Исследования не проводились.

**Передозировка.** Длительный прием (более 4-6 недель) и/или чрезмерные дозы могут привести к развитию псевдоальдостеронизма (гипокалиемия, задержка натрия, отеки, повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма, увеличение веса), в редких случаях может наблюдаться развитие миопатии и миоглобинурии, гипертонической энцефалопатии.

В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Не рекомендовано одновременное применение с противокашлевыми лекарственными средствами (в том числе лекарственными средствами, содержащими кодеин или дексстрометорфан).

Корень солодки, входящий в состав лекарственного средства, может препятствовать действию антигипертензивных средств.

При одновременном применении с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами, тиазидными и петлевыми диуретиками, кортикоステроидами и слабительными средствами возможно усиление гипокалиемии, совместный прием с данными средствами не рекомендован.

Применение одновременно с противоаритмическими средствами может привести к гипокалиемии и тяжелой желудочковой тахикардии.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

**Меры предосторожности.** Не следует во время приема сбора принимать другие препараты, содержащие солодку, из-за риска развития серьезных побочных реакций, таких как, задержка жидкости в организме, гипокалиемия, артериальная гипертензия, нарушения сердечного ритма. Препарат не рекомендуется применять

пациентам с заболеваниями почек, печени и сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как они более чувствительны к неблагоприятным последствиям приема солодки. Лекарственное средство не применять более 4 недель в течение года.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, развиваются нарушения дыхания, появляется кашель с гнойной мокротой), необходимо обратиться к врачу.

**Условия и сроки хранения.** Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте, при температуре 15<sup>0</sup>C–25<sup>0</sup>C. Приготовленный отвар при температуре от 8<sup>0</sup>C до 15<sup>0</sup>C – не более 2 суток.

**Срок годности.** 3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска.** Отпускают без рецепта.

**Упаковка.** По 50 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. В пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.

**Производитель.** ООО «НПК Биотест».

**Адрес.** Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.  
Тел. 8 (0152) 68-45-79.