

НД РБ

3862 - 2016

Инструкция по медицинскому применению (листок-вкладыш)

СОГЛАСОВАНО	
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ	
Приказ Министерства здравоохранения от « <u>14</u> » <u>12</u> 20 <u>16</u> г. № <u>1248</u>	
КЛС №	<u>11</u> от « <u>29</u> » <u>11</u> 20 <u>16</u> г.

Гербапект (Herbapect)

(*Thymi extractum fluidum + Primulae tinctura + Sulfoguaiaconum*)

(498 мг + 349 мг + 87 мг) / 5 мл, сироп

Сироп представляет собой темно-коричневую, полупрозрачную, густую жидкость с ароматным запахом.

Состав

5 мл сиропа содержит действующие вещества:

498 мг жидкого экстракта травы тимьяна (*Thymus vulgaris L., herba*) (1:2), экстрагент: этанол 30% (V/V), вода аммиачная 25%, глицерин 95%;

349 мг настойки корня первоцвета (*Primula veris L., radix*) (1:5) экстрагент: этанол 70% (V/V);

87 мг сульфогваякала (*Sulfoguaiaconum*).

Вспомогательное вещество: сорбитол жидкий некристаллизующийся.

Содержит 6,4 - 9,0% (V/V) этанола, т.е. до 378,8 мг этанола в 5 мл сиропа.

Гербапект это препарат в виде сиропа, его применение в качестве отхаркивающего средства основывается только на опыте продолжительного применения.

Показания к применению

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний.

Применение по указанному назначению основывается только на опыте продолжительного применения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, а также к растениям семейства губоцветные (Lamiaceae).

Беременность, период лактации. Детский возраст до 12 лет.

Бронхиальная астма. Не применять у детей с острым ларингитом и перенесенным ранее стенозирующим ларинготрахеитом.

В связи с содержанием этилового спирта лекарственное средство противопоказано пациентам с заболеваниями печени, алкоголизмом, эпилепсией, черепно-мозговой травмой и другими заболеваниями головного мозга со снижением судорожного порога.

Специальные предостережения и меры осторожности при применении

Лекарственное средство содержит 378,8 мг этанола в 5 мл сиропа, что эквивалентно 9,0 мл пива и 3,8 мл вина на дозу (5 мл сиропа).

В связи с содержанием этилового спирта лекарственное средство противопоказано пациентам с заболеваниями печени, алкоголизмом, эпилепсией, черепно-мозговой травмой и другими заболеваниями головного мозга со снижением судорожного порога, беременным и кормящим женщинам, детям до 12 лет.

Лекарственное средство содержит сорбитол, поэтому его не следует применять пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы.

Следует с осторожностью назначать лекарственное средство пациентам с гастритом,

*Григоренко
 prof. Уваров А. Г.*

3862 - 2016

язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки.

СОГЛАСОВАНО
 министерством здравоохранения
 Республики Беларусь
 Приказ Министерства здравоохранения
 Республики Беларусь

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или в случае ухудшения состояния (возникновение нарушения дыхания, повышение температуры, появление мокроты с примесью гноя или крови), следует прекратить прием лекарственного средства и незамедлительно проконсультироваться с врачом.

Применение у детей

В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта лекарственное средство противопоказано для применения у детей до 12 лет.

Применение во время беременности и кормления грудью

Безопасность применения в период беременности и кормления грудью не установлена. В связи с отсутствием данных и содержанием этилового спирта прием лекарственного средства во время беременности и лактации противопоказан.

Влияние на способность управлять автотранспортом и работать с механизмами

Лекарственное средство содержит этиловый спирт! В период лечения рекомендовано отказаться от вождения автотранспорта и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не рекомендовано применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашивание мокроты.

Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных средств, содержащих этиловый спирт.

Взаимодействия, связанные с наличием в составе этилового спирта:

- лекарственные средства, вызывающие дисульфирамоподобную реакцию (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия) при совместном приеме с алкоголем:

дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксифен, хлорамфеникол, хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид и другие гипогликемические препараты, гризофульвин, метронидазол, орнидазол, тинидазол, кетоконазол, прокарбазин;

- лекарственные средства, угнетающие функции центральной нервной системы.

Способ применения и дозировка

Препарат для перорального применения.

К упаковке прилагается мерный стаканчик.

Дети старше 12 лет и взрослые - 5 мл 3-4 раза в день после еды.

Не превышать рекомендуемую дозу.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Не рекомендован прием лекарственного средства в течение более 7 дней. Из-за содержания этилового спирта продолжительность лечения должна быть как можно короче.

Продолжительность приема у детей должна быть минимальной.

Передозировка

До сих пор не описано симптомов передозировки, при их появлении следует применить симптоматическое лечение.

НД РБ

3862 - 2016

Побочные действия

Возможны следующие побочные реакции:

аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, анафилактический шок,

ангионевротический отек (отек Квинке));

желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота).

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Условия и срок хранения

Хранить препарат в недоступном и незаметном для детей месте.

2 года. Не применять препарат Гербапект по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Хранить в оригинальной упаковке, при температуре не выше 25°C. Не хранить в холодильнике. Не замораживать.

Препарат отпускается без рецепта врача.

Упаковка: 150 г сиропа во флаконе из цветного (коричневого) стекла с алюминиевым желтым колпачком и мерным стаканчиком в картонной коробке с листком-вкладышем.

Производитель

Афлофарм Польская Фармация Лтд

ул. Партизанца 133/151

95-200 Пабянице, Польша