

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата
(информация для пациентов)

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь № 208

Залаин® крем для наружного применения от «22» 05 2017 № 208
сертаконазола нитрат

Полностью и внимательно прочтите данную инструкцию перед началом приема лекарственного средства, так как она содержит важную для Вас информацию.

- Сохраните этот листок. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к Вашему лечащему врачу или фармацевту.
- Это лекарственное средство назначено лично Вам, не следует передавать его другим людям. Оно может нанести вред их здоровью, даже если у них наблюдаются такие же симптомы заболевания, как у Вас.
- Если у Вас возникнет какой-либо побочный эффект или Вы заметите побочные эффекты, не указанные в этой инструкции, следует сообщить об этом Вашему врачу или фармацевту (см. раздел 4).

Данный листок-вкладыш содержит следующую информацию:

1. Что такое препарат Залаин® крем и для чего его применяют
2. Что следует знать до начала применения препарата Залаин® крем
3. Как следует применять препарат Залаин® крем
4. Возможные побочные эффекты
5. Как следует хранить препарат Залаин® крем
6. Срок годности
7. Условия отпуска из аптек
8. Содержимое упаковки и другая информация

1. Что такое препарат Залаин® крем и для чего его применяют

Крем Залаин® содержит сертаконазол, препарат имидазольной группы, который является противогрибковым лекарственным средством для местного применения.

Залаин® используется местно для лечения некоторых грибковых инфекций кожи (кистей рук, стопы, голени, ногтевого ложа, туловища и кожных складок, наружных половых органов и т.д.).

2. Что следует знать до начала применения препарата Залаин® крем

Не используйте препарат Залаин® крем в следующих случаях:

- Если у Вас аллергия к сертаконазолу (действующее вещество крема Залаин®) или какому-либо из вспомогательных веществ, приведенных в разделе 8;
- Если у Вас аллергия к любым другим противогрибковым препаратам этой группы;
- Крем Залаин® не предназначен для использования в офтальмологической практике.
Необходимо избегать контакта с глазами!

При применении препарата не рекомендуется использовать мыло с кислым pH.

Фертильность, беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны, кормите грудью, предполагаете, что беременны или планируете беременность, сообщите об этом Вашему лечащему врачу или фармацевту до начала применения этого препарата.

В экспериментах на животных сертаконазол, действующее вещество крема Залаин[®], не оказывал какого-либо вредного воздействия на плод.

При местном применении активное вещество практически не вс�ывается в организм человека.

Тем не менее, учитывая отсутствие данных о применении препарата во время беременности и в период кормления грудью, крем Залаин[®] может использоваться у беременных женщин и кормящих матерей, но только если польза, по мнению лечащего врача, превышает возможные риски.

Проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом или фармацевтом перед приемом любого лекарственного средства, если Вы беременны или кормите грудью.

Влияние лекарственного средства на способность управления транспортными средствами и работу с механизмами

Нет данных о том, что сертаконазол может повлиять на любые из вышеуказанных способностей.

Важная информация о некоторых ингредиентах крема Залаин[®]

Крем Залаин[®] содержит в качестве вспомогательного вещества 1 мг метилпарагидроксибензоата/1 г крема; это вещество может вызвать аллергические реакции (иногда отсроченные).

3. Как следует применять препарат Залаин[®] крем

Всегда применяйте крем Залаин[®], точно соблюдая указания Вашего лечащего врача. Вам следует проконсультироваться с лечащим врачом или фармацевтом, если Вы в чем-то не уверены.

Обычно рекомендуемая доза:

Один или два раза в сутки (вечером или утром и вечером), после тщательного мытья и вытираания, нанесите тонкий слой крема на пораженные участки кожи, с захватом примерно 1 см поверхности здоровой кожи. Продолжительность лечения зависит от типа возбудителя и локализации заболевания. Для полного клинического выздоровления и эффективной профилактики рецидивов обычно требуется лечение в течение 4 недель, хотя симптомы могут исчезнуть и раньше, между 2-й и 4-й неделями лечения.

Применение у детей не рекомендуется.

При лечении грибковых заболеваний очень важно сохранять пораженный участок сухим (особенно складки тела и межпальцевые области) и обеспечить его надлежащую вентиляцию (обувь и одежда).

Не рекомендуется использовать мыло с кислым pH (кислая среда может способствовать росту некоторых инфекционных агентов).



Если Вы использовали больше крема Залаин[®], чем необходимо

Вытрите излишки крема.

Если Вы забыли использовать крем Залаин[®]

Не применяйте двойную дозу для компенсации пропущенной дозы.

Если вы прекратили использование крема Залаин[®]

Во избежание любых рецидивов важно полностью ликвидировать инфекцию, поэтому не прекращайте лечение ранее, чем рекомендовано.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы об использовании данного лекарственного средства, проконсультируйтесь с Вашим врачом или фармацевтом.

4. Возможные побочные эффекты

Как и любое лекарственное средство, крем Залаин[®] может иметь побочные эффекты, которые, однако, проявляются не у всех.

Если какой-либо побочный эффект становится серьезным или Вы заметили побочные эффекты, которые не указаны в данной инструкции по применению, сообщите об этом Вашему лечащему врачу или фармацевту.

Иногда может возникать преходящее покраснение, но оно ограничивается местом применения и не требует прерывания лечения.

Препарат одинаково хорошо переносится при нанесении на неповрежденные или поврежденные участки кожи.

Сообщение о побочных эффектах

При обнаружении перечисленных побочных эффектов или возникновении эффектов, не упомянутых в данной инструкции, просьба обратиться к врачу или фармацевту.

Сообщая о побочных эффектах, Вы предоставите дополнительную информацию о безопасности данного лекарственного средства.

5. Как следует хранить препарат Залаин[®] крем

Хранить при температуре ниже 25° С, в недоступном для детей месте!

6. Срок годности

Не используйте после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Не используйте крем Залаин[®], если Вы заметили видимые признаки ухудшения его качества (например, изменение цвета).

7. Условия отпуска из аптек

Отпускается без рецепта.

8. Содержимое упаковки и другая информация

Что содержит крем Залаин[®]

Действующее вещество: 20 мг сертаконазола нитрата в 1 г крема.

Вспомогательные вещества: этиленгликоль и полиэтиленгликоль пальмитостеарат,

Zalain cream PIL BY 201605

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

лаурилмакрогоол глицериды, глицерила изостеарат, парафиновое масло, метилпарагидроксибензоат, сорбиновая кислота, очищенная вода.

Внешний вид препарата Залаин® крем и содержимое упаковки

Внешний вид: белый мягкий крем, без запаха или со слабым запахом жира.

Упаковка: 20 г крема расфасовывается в алюминиевые тубы с закрытым алюминиевой фольгой выходным отверстием. Навинчивающийся колпачок оснащен прокалывающим конусом. Каждая туба упакована в картонную пачку вместе с инструкцией по медицинскому применению для пациентов.

Информация о владельце регистрационного удостоверения и производителе

Владелец регистрационного удостоверения

ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС»

1106 Будапешт, ул. Керестури 30-38

ВЕНГРИЯ

Производитель

Феррер Интернасионал А.О., Барселона, Испания

