

**Инструкция
по медицинскому применению лекарственного средства
(информация для пациентов)**

ИНГАЛИПТ

Торговое название
Ингалипт

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от 31.05.2019 № 676

Международное непатентованное название
Отсутствует

Форма выпуска
Аэрозоль

Состав

Один баллон содержит:
активные вещества: стрептоцид растворимый – 0,75 г, сульфатиазола натрия гексагидрат – 0,75 г, тимол – 0,015 г, масло эвкалиптовое – 0,015 г, масло мяты перечной – 0,015 г;
вспомогательные вещества: этанол 96%, сахар, глицерин, полисорбат 80, вода очищенная, азот – до давления 0,6 МПа.

Описание

Прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета, которая находится в аэрозольном баллоне с клапаном непрерывного действия под давлением сжатого газа. Препарат при выходе из баллона образует дисперсную струю с характерным запахом тимола и ментола.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения заболеваний гортани и глотки. Антисептические средства.

Код АТС: R02AA20

Показания для применения

Инфекционно-воспалительные заболевания ЛОР-органов и слизистой оболочки полости рта: тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный и язвенный стоматиты.

Способы применения и дозировка

Применяется взрослым и детям в возрасте старше 3 лет местно, путем орошения на слизистые оболочки рта и носоглотки.

Перед применением препарата на аэрозольный баллон необходимо надеть распылитель, несколько раз встряхнуть баллон, после чего путем нажатия на распылитель до упора равномерно орошать препаратом пораженный участок, удерживая баллон строго вертикально.

За 1 сеанс ингаляции осуществляют 2-3 распыления, удерживая препарат в полости рта 5-7 минут.

Орошения проводят 3-4 раза в день. Продолжительность применения препарата зависит от интенсивности терапии и обычно составляет 7-10 суток.

Побочное действие

Со стороны иммунной системы

Аллергические реакции, включая зуд, крапивницу, высыпания на коже, отек в месте контакта, у лиц с повышенной чувствительностью возможно развитие ангионевротического отека (отек Квинке).

Со стороны дыхательной системы

Затруднение дыхания; возможно возникновение рефлекторного бронхоспазма, обусловленного содержанием эфирных масел.

Со стороны желудочно-кишечного тракта

Тошнота, рвота.

Местные реакции

Ощущение жжения во рту или першения, или комка в горле, гиперемия слизистой оболочки зева.

Прочие

Общая слабость.

В случае выявления каких-либо нежелательных явлений или необычных реакций следует проконсультироваться с врачом относительно дальнейшего применения лекарственного средства.

Противопоказания

Тяжелая почечная недостаточность, заболевания крови, тиреотоксикоз, I и II триместры беременности, лактация, повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Передозировка

В случае передозировки возможно усиление побочных эффектов препарата. При всех случаях передозировки необходимо отменить применение препарата, прополоскать полость рта теплой кипяченой водой.

Лечение симптоматическое.

Меры предосторожности

Перед применением лекарственного средства рекомендуется прополоскать полость рта теплой кипяченой водой. С пораженных участков полости рта с помощью стерильных тампонов удалить некротический налет.

После орошения полости рта препаратом следует удерживаться от приема пищи в течение 15-30 минут.

Препарат содержит этианол.

Не допускать попадания препарата в глаза! Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу. При возникновении реакций повышенной чувствительности, лечение должно быть прекращено. При длительном лечении рекомендуется систематический контроль картины крови, функции почек и печени.

С целью избегания закупорки распылителя по окончании манипуляции его необходимо продуть или поместить в стакан с чистой водой. Закрыть баллон защитным колпачком во избежание его загрязнения.

Лица пожилого возраста

В связи с повышенным риском развития нежелательных реакций, данной категории пациентов лекарственное средство назначают с осторожностью.

Дети

Не применять препарат детям младше 3 лет.

У детей возможно возникновение рефлекторного бронхоспазма в связи с наличием в составе препарата масла эвкалиптового и масла мяты перечной. Лечение детей следует проводить под наблюдением врача. Применять препарат детям в возрасте старше 3 лет, учитывая возможность возникновения рефлекторного бронхоспазма.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При одновременном применении Ингалипта с препаратами, ~~являющими производными~~ п-аминобензойной кислоты (новокаин, анестезин, дикаин), происходит инактивация антибактериальной активности сульфаниламидов.

Применение в период беременности и лактации

Противопоказан к применению в I и II триместры беременности и в период лактации.

Влияние на способность управлять автомобилем и работу с движущими механизмами

Водителям автотранспорта и операторам механизмов необходимо применять препарат с осторожностью в связи с тем, что препарат содержит спирт этиловый.

Препарат может искажать результаты исследования на алкоголь.

Упаковка

По 30 мл в баллоны аэрозольные алюминиевые с клапанами непрерывного действия. Баллоны обеспечены распылителем для горла "РГ" и защитным колпачком.

Каждый баллон с распылителем, защитным колпачком и листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Предохранять от падений, ударов, воздействия прямых солнечных лучей.

Срок годности

2 года. Препарат не должен применяться по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Информация о производителе (заявителе)

Произведено и расфасовано

АО «Стома», Украина

61105 г. Харьков, ул. Ньютона, 3

Упаковано

ООО «БЕЛАЛЕК», Республика Беларусь

222163 г. Жодино, ул. Советская, 9

тел.: +375447777701

e-mail: info@belalek.by