

**ИНСТРУКЦИЯ**  
(информация для пациентов)  
по медицинскому применению лекарственного средства  
**ГРОЦЕПРОЛ**

**Торговое название:** Гроцепрол.

**Международное непатентованное название:** Acetyl proline.

**Форма выпуска:** капсулы.

**Описание:** капсулы твердые желатиновые, белого цвета.

**Состав на одну капсулу:** каждая капсула содержит:

*действующее вещество:* N-ацетил-L-пролин моногидрат – 300 мг;

*вспомогательные вещества:* метилцеллюлоза, кальция стеарат.

**Состав капсулы твердой желатиновой номер 0:** желатин фармацевтический, глицерин, вода очищенная, краситель Е 171 (титана диоксид), натрия лаурилсульфат.

**Фармакотерапевтическая группа:** Ненаркотические анальгетики, нестероидные противовоспалительные средства.

**Код АТС:** N02BX.

**Фармакологическое действие**

Гроцепрол оказывает преимущественно противовоспалительное действие благодаря подавлению способности лейкоцитов к адгезии и инфильтрации поврежденных тканей и связанной с этим плазматической экссудации. Такое противовоспалительное действие опосредованно вызывает обезболивающий эффект.

При применении препарата уменьшались характерные боли (включая боль в начале движения, боль в покое и боль при выполнении физических упражнений) и проявления воспаления, а двигательные функции улучшались.

**Показания к применению**

Дегенеративные заболевания суставов, например, остеоартроз коленного, тазобедренного, плечевого суставов, позвоночника, мелких суставов; полиартрозы; хондропатия надколенника, артриты, периартриты, бурситы, тендиниты, тендовагиниты.

**Способ применения и дозы**


Внутри по 1 капсуле (300 мг) 1-3 раза в сутки, предпочтительно до приема пищи, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости. Максимальная суточная доза – 900 мг, рекомендуемый курс лечения – до 3 месяцев.

Если время приема очередной дозы Гроцепрола было пропущено, не следует принимать двойную дозу. Необходимо продолжать прием препарата в соответствии с назначенной схемой лечения.

**Побочное действие**

*Со стороны пищеварительной системы*

Часто ( $\geq 1/100$ ,  $< 1/10$ ): тошнота, потеря аппетита, боли в животе или диарея, обычно транзиторные.



### *Реакции гиперчувствительности*

Нечасто ( $\geq 1/1000$ ,  $< 1/100$ ) возникают аллергические реакции (покраснение кожи, зуд, экзантема).

Очень редко ( $< 1/10000$ ) сообщалось о таких реакциях: алоpecia, артралгия, васкулиты, крапивница, отек Квинке, аллергическая эозинофилия.

В случае возникновения вышеперечисленных побочных реакций или побочных реакций, не указанных в данной инструкции, необходимо обратиться к врачу.

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата, пептическая язва, тяжелая почечная недостаточность, беременность, период лактации, детский возраст.

### **Передозировка**

Гроцепрол малотоксичен. Интоксикации у людей до сих пор не наблюдалось, и она маловероятна.

*Симптомы:* усиление выраженности побочных эффектов.

*Лечение:* отмена препарата. Специфический антидот неизвестен. Лечение симптоматическое.

### **Меры предосторожности**

*Применение у детей.* Противопоказано.

*Применение в пожилом возрасте.* Дополнительные исследования применения Гроцепрола у пожилых пациентов не проводились.

*Применение во время беременности и в период лактации.* Противопоказано.

*Влияние на способность к управлению автотранспортом и другими потенциально опасными механизмами.* Гроцепрол в целом не влияет или незначительно влияет на способность концентрировать внимание и на скорость реакции. Однако в случае возникновения побочных реакций скорость реакции может изменяться, что может повлиять на способность управлять автомобилем и работать с механизмами.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

У пациентов, которые получают антикоагулянтную терапию антагонистами витамина К, не исключается влияние Гроцепрола на свертываемость крови. В этом случае рекомендуется проводить тщательный мониторинг протромбинового времени.

### **Условия хранения**

В защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Упаковка**

По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке.

По две или три контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

### **Условия отпуска**

По рецепту.

---

**Производитель:**  
РУП "Белмедпрепараты",  
Республика Беларусь, 220007, г. Минск,  
ул. Фабрициуса, 30, т./ф.: (+375 17) 220 37 16,  
e-mail: medic@belmedpreparaty.com

